ارتباط برهمکنش‌های KIR-HLA با بیماری‌ها

فرهاد شاهسوار[1]، طاهره موسوی[2]، کبری انتظامی[3]، علیرضا آذرگون[4]
1-گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران
2-گروه ایمونولوژی و مرکز تحقیقات مقاومت‌های میکروبی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
3-گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
4-گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران

یافته / دوره سیزدهم / شماره 3 / پاییز 90 / مسلسل 49

چکیده

دریافت مقاله: 89/11/16 ، پذیرش مقاله: 90/1/21

Ø پذیرنده های شبه ایمونوگلبولینی سلول کشنده (KIR) یک خانواده تازه کشف شده از پذیرنده های فعال کنندگی و مهاری است که عملکرد سلول کشنده طبیعی (NK) را کنترل می‌کند. KIR به عنوان یک خانواده متنوع از پذیرنده‌هایی است که به سرعت به وسیله دوپلیکاسیون ژنی و وقایع نوترکیبی تکامل یافته است. در ابتدا این یافته ها برای یک خانواده ژنی درگیر در پاسخ ایمنی ذاتی غیر منتظره بود. مولکول‌های آنتی‌ژن لکوسیت انسان (HLA) کلاس I به عنوان لیگاندهایی برای KIR عمل می‌کنند. برخی مطالعات ارتباط با بیماری نقش برهمکنش‌های این لوکوس‌ها را در بیماری‌های عفونی، اختلالات خودایمنی/التهابی، سرطان و تولیدمثل نشان داده است. نتایج عملکردی حاصله از مکانیسمی بر اساس یک طیف از مهار تا فعالیت از طریق ژنوتیپ‌های مختلف ترکیب KIR-HLA در بیماری‌ها حمایت می‌کند. این مقاله مروری خصوصیات اصلی این ژن‌ها را خلاصه کرده و بحث می‌کند که چگونه ممکن است آنها هم در پاتوژنز بیماری و هم در بهبود آن درگیر باشند.

Ø واژه‌های کلیدی: ایمنی ذاتی، سلول‌های NK، KIR، HLA، بیماری.

آدرس مکاتبه: تهران، بزرگراه همت،پردیس همت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
پست الکترونیک: tshabestari@sina.tums.ac.ir

[Downloaded from yafteh.lums.ac.ir on 2026-11-02]

مقدمه

سلول‌های کشنده طبیعی (Natural Killer, NK) زیرگروهی از لنفوسیت‌ها هستند که حدود10 درصد از کل لنفوسیت‌های خون محیطی را شامل می‌شوند. سلول‌های NK به دلیل نقش در پاسخ‌های ایمنی ذاتی، اولین خط دفاعی علیه عوامل عفونی و سرطان را فراهم می‌سازند (2،1). همچنین تصور می‌شود که این سلول‌ها در خود ایمنی نیز نقش دارند (4،3). پذیرنده‌های شبه ایمونوگلبولینی سلول کشنده (Killer-cell Immunoglobulin-like Receptor, KIR) مولکول‌های سطحی تنظیم کننده‌ای هستند که بر روی سلول‌های NK و برخی زیر گروه‌های لنفوسیت‌های T یافت می‌شوند.

این پذیرنده‌های پلی‌مورفیک با موتیف‌های خاصی از مولکول‌های آنتی‌ژن لکوسیت انسان (Human Leukocyte Antigen, HLA) کلاس یک برهمکنش کرده و موجب تعدیل فعالیت لیزکنندگی سلول‌های NK می‌گردند. برخی KIR ها با مولکول‌های HLA-C، HLA-Bw4و HLA-A3/11سلول‌های هدف برهمکنش دارند (جدول1) ولی برای برخی دیگر هنوز لیگاندهای مربوطه شناسایی نشده اند (8-5).

ژن‌های KIR بر روی کروموزوم شماره 19 و در مجموعه پذیرنده لکوسیت قرار دارند و اختلاف زیادی از لحاظ نوع و تعداد در میان نژادهای مختلف نشان می‌دهند. چهارده پذیرنده KIR مختلف در انسان‌ها شناخته شده است. این پذیرنده‌ها بر مبنای تعداد دومن‌ها (Domain, D) ایمونوگلبولینی خارج سلولی خود به دو گروه 2D یا 3D تقسیم شده‌اند.

جدول شماره 1- KIR ها و لیگاندهای شناخته شده آنها.

Receptors	Ligands	Group
2DL2,2DL3,2DS2,2DS3	HLA-Cw*01/03/07/08/12/13/14/1507/1601	C1(Ser77,Asn80)
2DL1,2DS1	HLA-Cw*02/04/05/06/1242/15/1602/17	C2(Asn77,Lys80)
3DL1	HLA-Bw4	-
3DL2	HLA-A3/11	-

وجود یک دنباله سیتوپلاسمی بلند(Long,L)حاوی دو موتیف مهاری با ساختار تیروزین در پذیرنده ایمنی (Immunoreceptor Tyrosine-based Inhibition Motif, ITIM) که سیگنال‌های مهاری را انتقال می‌دهد از مشخصات KIR های مهاری (2DL و 3DL) می‌باشد، در حالی که وجود دنباله‌های سیتوپلاسمی کوتاه (Short,S) مربوط به KIR های فعال‌کنندگی (2DS و 3DS) است.


هشت ژن KIR3DL1-3، KIR2DL1-3 و KIR2DL5A/B، KIRهای مهاری (inhibitory KIR, iKIR) و شش ژن KIR3DS1 و KIR2DS1-5، KIRهای فعال‌کنندگی (activating KIR, aKIR) و یک ژن پذیرنده KIR2DL4 با هر دو عملکرد مهاری و فعال‌کنندگی را کد می‌کنند. دو ژن مجموعه KIR (KIR2DP1 و KIR3DP1) ژن‌های کاذب (Pseudogenes) هستند که هیچ مولکول KIR عملکردی را کد نمی‌کنند (11-9). دو نوع هاپلوتیپ KIR (گروه‌های A و B) براساس محتوای ژنی شرح داده شده است. هاپلوتیپ‌های گروه B با حضور یک یا تعداد بیشتری از ژن‌های KIR2DL5، KIR2DS1-3، KIR2DS5 و KIR3DS1 مشخص می‌گردند، در حالی که هاپلوتیپ‌های گروه A به وسیله عدم حضور این ژن‌ها مشخص می‌شوند (14-12).

تنوع نژادی در ژنوتیپ‌های ترکیب KIR-HLA

با توجه به این که ژن‌های KIR برروی کروموزوم 19و ژن‌هایHLA برروی کروموزوم6 قرار دارند و تنوع قابل توجهی را نشان می‌دهند، تفکیک مستقل این خانواده‌های ژنی غیرمرتبط در حین تولید گامت‌ها، تعداد و نوع ترکیب‌های KIR-HLA به ارث رسیده در افراد را متغیر می‌کند (15). افراد حامل ژنوتیپ‌های هموزیگوت گروه KIR A (ژنوتیپ‌های AA) در اکثر جمعیت‌های نژادی شایع هستند (16). هندیان و بومیان استرالیا

[Downloaded from yafteh.lums.ac.ir on 2026-11-02]

در این مورد استثناء بوده و در اغلب مواقع حامل ژنوتیپ‌های AB و BB می‌باشند. سلول‌های NK از افراد هموزیگوت AA می‌توانندحداکثر چهار پذیرنده iKIR (2DL1، 2DL3، 3DL1 و 3DL2) و یک پذیرنده فعال کنندگی KIR2DS4 را بیان کنند (شکل1). در مقابل، افراد حامل ژنوتیپ‌های AB و BB می‌توانند حداکثر پنج پذیرنده iKIR (2DL1، 2DL2/3، 2DL5، 3DL1 و 3DL2) و دو تا شش پذیرنده aKIR را بیان کنند. عملکرد پذیرنده‌های iKIR به در دسترس بودن لیگاندهای HLA کلاس I اختصاصی مربوطه بستگی دارد (17).



شکل 1. مدل مشارکت ژنوتیپ های ترکیبی KIR-HLA در بیماری های انسان (17).

[Downloaded from yafteh.lums.ac.ir on 2026-11-02]

تنها برخی افراد حامل لیگاندهای HLA کلاس I مربوطه برای همه پذیرنده‌های iKIR هستند، ولی اکثر افراد حامل لیگاندها برای دو تا سه پذیرنده iKIR می‌باشند (18،15). در حدود20 درصد از مردم تنها حامل یک جفت iKIR-HLA هستند (شکل1، ژنوتیپ‌های1و3 ترکیب KIR-HLA). از آنجایی که پذیرنده‌های KIR در سلول‌های NK به صورت کلونال در یک روش تصادفی بیان می‌شوند هر کلون سلول NK تنها بخشی از ژن‌های موجود در مجموعه ژنی را بیان می‌کند (17).

بنابراین بخش قابل‌توجهی از سلول‌های NK در گردش افراد با یک جفت iKIR-HLA ممکن است iKIR برای مولکول‌های HLA کلاس I خودی را بیان نکنند (20،19)، و سلول‌های NK فاقد بیان iKIR ممکن است خودواکنشی را در بافت‌های خودی تحت استرس با توسعه هرچه بیشتر شرایط خودایمنی سیستمیک راه‌اندازی نمایند. علاوه بر این، عوامل محیطی مؤثر بر بیان مولکول‌های HLA کلاس I می‌توانند سبب شکسته شدن تحمل به خود شوند و شروع خودایمنی را در افراد حامل تنها یک ترکیب iKIR-HLA القا کنند (17).

حضور لیگاند HLA کلاس I مربوطه فراوانی سلول‌های NK بیان‌کننده پذیرنده iKIR اختصاصی را افزایش می‌دهد (21).بنابراین پیش‌بینی می‌شود که اکثر سلول‌های NK فردی که حامل بیش از یک جفت iKIR-HLA است پذیرنده‌های iKIR متعددی را بیان می‌کنند که سبب مهار قوی و در نتیجه استعداد ابتلا کمتر به خودایمنی می‌شوند(شکل1، ژنوتیپ‌های 2 و 4 ترکیب KIR-HLA). از طرف دیگر، ایجاد بیش از حد سیگنال‌های مهاری توسط برهمکنش‌های iKIR-HLA متعدد ممکن است از طریق مسدود کردن عملکرد اجرایی سلول‌های NK در برابر عوامل بیماریزا و بافت‌های بدخیم اثرات زیان‌آوری داشته باشد (17).

اگرچه بیان سطح سلولی و لیگاندهای پذیرنده‌های aKIR مشخص نشده‌اند، ولی مجموعه‌ای از اطلاعات ژنتیک اپیدمیولوژیکی ارتباط مشخص aKIR را در ایمنی ضدویروسی (23،22)، بیماری‌های خودایمنی(27-24) و سرطان (29،28) نشان داده‌اند. در این مدل‌ها، تصور می‌شود که سیگنال‌های فعال‌سازی بر مهار وابسته به HLA غلبه می‌کنند (30).

ژنوتیپ‌های ترکیبی KIR-HLA با غلبه مهاری(iKIR+HLA>aKIR) احتمالاً در برابر خودایمنی محافظ ولی به عفونت و تومور مستعدکننده هستند (شکل1، ژنوتیپ 2 ترکیب KIR-HLA). در مقابل، ژنوتیپ‌های ترکیبی KIR-HLA با غلبه فعال‌کنندگی(iKIR+HLA<aKIR) احتمالا تسهیل‌کننده خودایمنی ولی در دفاع ضدویروسی و ضدتوموری کاربردی می‌باشند (شکل1، ژنوتیپ 3 ترکیب KIR-HLA) (17).

انواع ژنوتیپ‌های ترکیبی KIR-HLA در پاتوژنز بیماری‌ها و مقاومت در مقابل عفونت‌های ویروسی، بیماری‌های خودایمنی، اختلالات التهابی و سرطان‌ها دخیل دانسته شده‌اند (جدول2) (31). به طور کلی، ژنوتیپ‌های فعال‌کنندگی به نظر می‌رسد که درعفونت‌های ویروسی از قبیل ویروس نقص ایمنی انسان و ویروس هپاتیت C مفید باشند، در حالی که این ژنوتیپ‌ها خطر ابتلا به خود ایمنی و شاید سرطان‌هایی که یک مؤلفه التهابی در پاتوژنز خود دارند را افزایش می‌دهند.

[Downloaded from yafteh.lums.ac.ir on 2026-11-02]

جدول 2. ارتباط بین ترکیب های KIR-HLA و بیماری ها(31).

Disease	KIR–HLA ligand pair	Effect
Infectious diseases		
HIV	*KIR3DS1/Bw4-80I*	Slower progression
	*KIR3DL1*004/Bw4*	Slower progression
	*KIR3DL1*h/Bw4 80I*	
	KIR3DS1	Reduced risk of infection
HCV	*KIR2DL3/HLA-C1* homozygosity	Resolution of infection
Human cytomegalovirus (HCMV)	KIR2DL1 expression on all NK cells	Recurrent CMV infection
	>1 activating *KIR* in donor in bone marrow transplantation	Protection from CMV reactivation in the recipient
Herpes simplex virus (HSV)	*KIR3DS1* in absence of *Bw4*	Reactivation of HSV during IRD in HIV
M. tuberculosis	*KIR2DL1; KIR2DL3*	Susceptibility
P. falciparum	*KIR3DL2*002*	High response to infected RBCs
Autoimmune and inflammatory conditions		
Psoriatic arthritis	*KIR2DS1/2DS2; HLA-Cw* group homozygosity	Susceptibility
Psoriasis	*KIR2DS1/HLA-Cw06*	Susceptibility
	KIR2DS1; KIR2DL5; KIR haplotype B	Susceptibility
Rhuematoid vasculitis	*KIR2DS2/HLA-Cw03*	Susceptibility
Scleroderma	*KIR2DS2+/2DL2–*	Susceptibility
Acute coronary syndrome	De novo expression of KIR2DS2 on $CD4+CD28^{nul}$ cells	Susceptibility
IDDM	*KIR2DS2/HLA-C1*	Susceptibility
Endometriosis	*KIR3DS1/Bw4*	Protection
Birdshort chorioretinopathy	Weak inhibitory *KIR/HLA* combinations and activating *KIR* in HLA-A*29+ individuals	Susceptibility
Idiopathic bronchiectasis	*HLA-C1/C1 and 2DS1/2DS2*	Susceptibility
Primary sclerosing cholangitis	*KIR3DL1/Bw4; KIR2DL1/HLA-C2*	Protection
Cancer		
Malignant melanoma	*KIR/2DL2/2DL3; HLA-C1*	Susceptibility
Leukemia	*KIR2DL1; KIR2DL2; KIR2DL3*	Susceptibility
Hodgkin's lymphoma	*KIR2DS1; KIR3DS1*	Protection
Nasopharyngeal carcinoma	≥5 activating *KIR*	Susceptibility
Cervical cancer	*KIR3DS1* and absence of *HLA-C2* and/or *HLA-Bw4*	Susceptibility
T-LGL	Expression of inhibitory KIR in absence of ligands	More severe disease
NK-LGL	Expression of activating KIR	May contribute to disease pathogenesis
Sezary syndrome	Expression of KIR3DL2	Useful diagnostic marker
Reproduction		
Preeclampsia	Mothers with *AA KIR* genotype; fetus with *HLA-C2*	Susceptibility
Recurrent miscarriages/spontaneous abortions	Lack of *KIR2DS1* in mothers and increased frequency of *HLA-C2* in both mother and male partner	Susceptibility
	Increased *KIR2DS2* and decreased *HLA-C2* frequency, overall increased frequency of activating *KIR*	Susceptibility
	Higher cell surface expression of KIR2DL4	Susceptibility

بیماری‌های عفونی

1- عفونت ویروس نقص ایمنی انسان (HIV)

جدایی KIR3DL1 و KIR3DS1 به عنوان آلل‌هایی از یک لوکوس و حدود97درصد تشابه توالی در دومن‌های خارج سلولی، پیشنهاد می‌کند که آنها ممکن است به لیگاندهای مشابه‌ای اتصال یابند. مولکول‌های HLA-Bw4، به ویژه Bw4-80I، لیگاندهایی برای KIR3DL1 هستند (34-32). در افراد مبتلا به HIV مشاهده شده است که ترکیب KIR3DS1 با لیگاند HLA-B Bw4-80I با پیشرفت آهسته‌تر به سمت ایدز، کاهش متوسط بار ویروسی و حفاظت در برابر عفونت‌های فرصت طلب ارتباط دارد (22، 35). به طور کلی، مطالعات گزارش شده تا این تاریخ نشان می‌دهند که ترکیب KIR-HLA با پتانسیل

[Downloaded from yafteh.lums.ac.ir on 2026-11-02]

قوی فعال‌سازی در مقابل HIV محافظت کننده هستند، به ویژه این که لوکوسKIR3DL1/S1 مهمترین نقش را در این خصوص دارد .

2- عفونت ویروس هپاتیت C (HCV)

مشابه عفونت HIV، ژنوتیپ‌های فعال‌کنندگی ترکیب KIR-HLA در نتیجه عفونت HCV نیز دخیل دانسته شده‌اند. همان طور که در بالا ذکر شد، داده‌های قبلی نشان داده‌اند که پاسخ مهاری KIR2DL1+HLA-C2 از پاسخ مهاری KIR2DL3+HLA-C1 قوی‌تر می‌باشد (37،36). در افراد آلوده با ماده تلقیحی با دوز کم ویروسی، ترکیب ژنوتیپی KIR2DL3+HLA-C1، که به لحاظ نظری سیگنال‌های مهاری ضعیف‌تر و در نتیجه پتانسیل فعال‌سازی بیشتری دارد، در پاکسازی خود به خودی ویروس محافظت کننده است (23). مطالعه دیگری نیز KIR2DL3 را در پاکسازی HCV دخیل دانسته است (38).

3- عفونت سایتومگالوویروس (CMV)

سلول‌های NK در عفونت‌های ویروس هرپس مهم هستند زیرا افراد دچار نقص در سلول‌های NK به طور ویژه مستعد ابتلا به این عفونت‌ها هستند (39). سایتومگالوویروس‌ها به منظور فرار از سیستم ایمنی پروتئین‌های متعددی را کد می‌کنند که با بیان MHC کلاس I تداخل دارند (40) و در نتیجه سلول‌های آلوده را بیشتر مستعد حمله توسط سلول‌های NK می‌نمایند. مطالعه موردی یک کودک با یک سندرم نقص ایمنی جدید و عفونت راجعهCMV (41)، که کل جمعیت سلول‌های NK وی KIR2DL1 را بیان می‌کردند و خود کودک نیز دارای لیگاند HLA-C2 بود، این امکان را قوت بخشید که ترکیب به شدت مهاری KIR2DL1+HLA-C2 فعالیت سلول NK را فلج می‌کند و سلول‌ها را از استقرار یک پاسخ محافظتی در برابر CMV محروم می‌نماید. شواهد بیشتر برای محافظت با واسطه KIR در برابر عفونت CMV از گزارشی مشتق می‌شود که نشان می‌دهد KIRهای فعال‌کنندگی در مقابل فعال شدن مجدد CMV در طول پیوند سلول‌های بنیادی با تخلیه سلول‌های T محافظت‌کننده هستند (42). بنابراین، همانند دیگر عفونت‌های ویروسی، فعال شدن سلول NK به نظر می‌رسد که در برابر عفونت CMV محافظت کننده باشد.

4- سل

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به شدت در برخی از نقاط جهان آندمیک است. در یک مطالعه اخیر، فراوانیKIR2DL1 و KIR2DL3 به طور قابل توجهی در بیماران مبتلا بالاتر بوده ، اگر چه بعد از تصحیح برای مقایسه‌های چندگانه، تنها تفاوت KIR2DL3 به طور ضعیف معنی‌دار باقی مانده است (43).

5- مالاریا

اطلاعات کمی در مورد پاسخ سلول‌های NK به تک یاخته‌ها وجود دارد. حامل‌های KIR3DL2*002 سطوح بالاتری از IFN-γ را در پاسخ به فعال شدن توسط گلبول‌های قرمز آلوده به پلاسمودیوم فالسیپاروم تولید می‌کنند (44). سلول‌های NK منبع عمده IFN-γ در اوایل عفونت انگل مالاریا هستند و فعال شدن سلول NK ممکن است توسط ارتباط با اجزا میلوئید سیستم ایمنی بدن تنظیم شود (45).

بیماری‌های خودایمنی و اختلالات التهابی

ارتباط‌های KIR با حساسیت به شرایط خود ایمنی/التهابی همواره به KIR های با دنباله کوتاه (فعال‌کنندگی) اشاره دارند. KIR های فعال‌کنندگی از نظر تکاملی جوان‌تر هستند و احتمالاً از KIR های مهاری مشابه منشا گرفته‌اند (46). تنوع در فراوانی KIR های فعال‌کنندگی در همه جمعیت‌های نژادی گسترده است (47)، اما تنوع آللی آنها در مقایسه با پذیرنده‌های مهاری بسیار محدود می‌باشد(48).

[Downloaded from yafteh.lums.ac.ir on 2026-11-02]

فراوانی‌های فنوتیپی ارتباط منفی قوی را بین KIRهای فعال‌کنندگی و لیگاندهای آنها (یا لیگاندهای قلمداد شده) و برعکس ارتباط مثبت ضعیف را بین KIRهای مهاری و لیگاندهای آنها در همه جمعیت‌ها نشان می‌دهند. این اطلاعات نشان دهنده فشارهای گزینشی هستند که همواره فراوانی KIRهای فعال کنندگی و لیگاندهای آنها را پایین نگه‌می‌دارند، که البته شاید علت آن فشارهای گزینشی از جانب بیماری‌های خود ایمنی باشد (47).

1- آرتریت روماتوئید (RA)

شرایط مختلف شامل صدمه به عروق و التهاب، ارتباط با KIR2DS2 را نشان داده‌اند. فراوانی KIR2DS2 در بیماران RA با واسکولیت در مقایسه با گروه کنترل سالم و بیماران RA بدون واسکولیت افزایش یافته است. همچنین آلل HLA-Cw*03،یک آلوتیپ HLA-C1 یعنی لیگاندی برای KIR2DS2، در افراد مبتلا به واسکولیت افزایش داشته است (27). سایر ارتباط‌های KIR-HLA با تظاهرات بالینی متفاوت RA عبارتند از: ژنوتیپ $KIR2DL3^{+}/2DS3^{-}$، که در بیماران با تشخیص زودرس حاضر می‌باشند و KIR2DS1 و KIR3DS1، که در بیماران مبتلا به تخریب استخوان بیشتر هستند (49).

2- پسوریازیس و سایر اختلالات

گروه B هاپلوتیپ‌های KIR (50) و KIR2DS1 به تنهایی (51) و یا در ترکیب با HLA-Cw6 (یک لیگاند برای KIR2DS1) در ارتباط با پسوریازیس گزارش شده‌اند (52). همچنین، اثر ژنوتیپ‌های ترکیب KIR-HLA در آرتریت پسوریاتیک توصیف شده‌اند. بدین ترتیب که، ژنوتیپ‌های اعطا کننده حداکثر فعالیت (KIR2DS1 و یا KIR2DS2 با هموزیگوت HLA-C2 یا HLA-C1) مستعدکننده و ژنوتیپ‌های اعطا کننده حداکثر مهار (فقدان پذیرنده‌های فعال‌کنندگی KIR2DS1 و KIR2DS2 و حضور هر دو لیگاند مهاری HLA-C1 و HLA-C2) محافظت‌کننده هستند (25).

افزایش KIR2DS2 در غیاب KIR2DL2 در بیماران مبتلا به اسکلرودرمی مشاهده شده است (53).

ژن‌های فعال‌کنندگی KIR با شرایط التهابی دیگر از قبیل آندومتریوز (54)، برونشکتازی ایدیوپاتیک(55)، اسپوندیلیت انکیلوزان(56) و دیابت ملیتوس(57،24) نیز ارتباط داشته‌اند. جهت حمایت از مدل‌های مختلف مستعدکننده به شرایط خود ایمنی، شاهد عملکردی برای برهمکنش بین KIR ها با زنجیره کوتاه و لیگاندهای مربوطه آنها لازم است.

سرطان‌ها

1- تومورهای جامد

از دست دادن مولکول‌های MHC کلاس I تومورها نقشی را برای سلول‌های NK در تخریب سلول‌های تغییر شکل یافته به وجود می‌آورد. سطوح بالاتر مهار با واسطه KIR همچنین ممکن است فرار تومور را تسهیل نماید. همانطور که برای ملانوم نشان داده شده است، ترکیب ژنوتیپی KIR2DL2/3+HLA-C1 در بیماران در مقایسه با کنترل‌ها فراوان‌تر (29) و KIR3DL1+Bw4-80I در بیماران مبتلا به ملانوم متاستاتیک بالاتر بوده است (58).

نقشی برای KIR2DS4 در ملانوم از طریق اتصال آن به لیگاندهای غیر HLA بیان شده بر روی رده های سلولی ملانوم و ملانوم اولیه مطرح شده بود (59)، ولی این اطلاعات با مطالعه‌ای که تفاوتی در فراوانی KIR2DS4 در بیماران در مقابل کنترل‌ها نشان نمی‌داد (29) مغایر بود. همچنین پیشنهاد شده است که KIRهای مهاری ممکن است به فقدان پاسخ‌های ضدتوموری NK یا CTL در سرطان سلول کلیوی کمک کنند (60).

ژنوتیپ‌های فعال‌کنندگی KIR بسته به این که التهاب یک جز مهم پاتوژنز تومور باشد یا نباشد ممکن است اثرات متضادی در بدخیمی‌های مختلف ایجاد نمایند. برخلاف اثرات مستعدکنندگی ژنوتیپ‌های مهاری KIR-HLA در سرطان‌هایی که یک جز

[Downloaded from yafteh.lums.ac.ir on 2026-11-02]

التهابی هیچ نقش آشکاری در پاتوژنز آنها ندارد، مشاهده شده که ژنوتیپ‌های به شدت مهاری KIR-HLA در واقع در برابر سرطان گردن رحم محافظت کننده بودند (28). فعال شدن سلول NK ممکن است به ایجاد یک حالت التهابی مزمن در پاسخ به ویروس پاپیلومای انسانی، عامل سرطان گردن رحم، که یک مرحله آغازین ایجاد سرطان می‌باشد کمک کند. افزایش تعداد KIRهای فعال‌کنندگی نیز در ارتباط با سرطان نازوفارنکس، سرطانی که به شدت به عفونت EBV مرتبط می‌شود، مشاهده شده است (61).

البته تعیین این موضوع مهم است که آیا نتایج موافق درسرطان‌های دیگری از قبیل سرطان معده و سرطان روده بزرگ که به وضوح شامل التهاب در پاتوژنز خود هستند نیز مشاهده می‌شوند. از طرف دیگر، KIR3DS1 با آلوتیپ‌های Bw4-80I در مقابل ایجاد کارسینوم سلول کبدی در بیماران مبتلا به عفونت مزمن ویروس هپاتیت C محافظت کننده بوده (62)، علی‌رغم این که احتمالاً در برخی موارد التهاب در ایجاد کارسینوم سلول کبدی نقش دارد.

2- بدخیمی‌های خونی

بیان غیرطبیعی KIR با بدخیمی‌های خونی نیز ارتباط داشته است. KIRهای مهاری 2DL1، 2DL2 و 2DL3 به طور قابل توجهی در میان بیماران مبتلا به لوسمی فراوان‌تر بودند (63). فراوانی ژن‌های KIR2DL5A و KIR2DL5B نیز در بیماران مبتلا به بیماری لنفوپرولیفراتیو لنفوسیت‌های بزرگ گرانول‌دار نوع NK بیشتر بود (64). در همین راستا، پذیرنده‌های فعال‌کنندگی KIR3DS1 و KIR2DS1 با محافظت در یک مطالعه خانوادگی لنفوم هوچکین ارتباط داشته‌اند(65). در مطالعه شاهسوار و همکاران نیز پذیرنده فعال‌کنندگی KIR2DS3 با محافظت در مقابل لوسمی میلوئیدی حاد ارتباط داشت (66).

بیان KIR3DL2 بر روی سلول‌های T غیرطبیعی بیماران مبتلا به سندرم سزاری مشاهده شده است (67). KIRهای مهاری همچنین بر روی سلول‌های لوسمی لنفوسیت‌های بزرگ گرانول‌دار T (T-LGL) بیان می‌شوند (68) و افزایش شدت بیماری با فقدان لیگاندهای HLA برای KIR بیان شده مرتبط است (69). KIRها بر روی سلول‌های لوسمی لنفوسیت‌های بزرگ گرانول‌دار NK (NK-LGL) نیز بیان می‌شوند (68) و KIRهای فعال‌کنندگی در میان آنها غالب می‌باشند (70).

اختلالات تولید مثل

1- پره‌اکلامپسی

پره‌اکلامپسی شرایط ایجاد شده توسط تهاجم نامناسب تروفوبلاست خارج ویلوسی به سرخرگ‌های مارپیچی مادری است، که به خون‌رسانی ضعیف جفت منجر می‌گردد (71). سلول‌های NK رحمی(uNK)، که 90-50 درصد لکوسیت‌های دسیدوا را تشکیل می‌دهند، $CD56^{bright}$ می‌باشند و سایتوکاین‌ها، کموکاین‌ها و عوامل رگ‌سازی که تصور می‌شود در بازسازی سرخرگ‌های مارپیچی در طول بارداری دخیل هستند را تولید می‌کنند (72).

آنها همچنین پذیرنده‌های KIR2D را بیان می‌نمایند که آلوتیپ‌های HLA-C را شناسایی می‌کنند. تروفوبلاست‌های جنینی HLA-G ، HLA-E و HLA-C را بیان می‌کنند (73)، که تنها HLA-C پلی‌مورفیک است. غالب بودن هموزیگوت هاپلوتیپ A در مادران مبتلا به پره‌اکلامپسی همراه با حضور HLA-C2 در جنین (74) مطرح می‌کند که مهار شدید سلول‌های NK دسیدوا از طریق KIR2DL1 و HLA-C2 به مهار شدید سلول‌های uNK منجر می‌گردد، که آن نیز به نوبه خود به بازسازی عروق خونی مادری آسیب می‌رساند. در مقابل، KIRهای فعال‌کنندگی به نظر می‌رسد که احتمال پره‌اکلامپسی را کاهش می‌دهند. با توجه به عواقب شدید برهمکنش‌های نامناسب مادری- جنینی، بیشتر فشارهای گزینشی بر لوکوس‌های

[Downloaded from yafteh.lums.ac.ir on 2026-11-02]

KIR ممکن است از طریق اثر آن بر بیماری‌های تولیدمثلی تحمیل شده باشند (31).

2- سقط مکرر

تعادل در سطح فعال‌سازی مهار ممکن است در موفقیت تولیدمثل ضروری باشد زیرا فعال‌سازی بیش از حد سلول‌های NK، مانند مهار بیش از حد، می‌تواند در حفظ بارداری مضر باشد. لنفوسیت‌های بزرگ گرانول‌دار نوع NK در واکنش‌های ایمنی علیه جنین دخیل دانسته شده‌اند و تعداد آنها در رحم مادرانی که تمایل به سقط جنین دارند افزایش می‌یابد (75). کاهش فراوانی KIRهای مهاری یا افزایش تعداد ترکیب‌های فعال‌کنندگی KIR-HLA در ارتباط با حاملگی‌های ناموفق (77،76) و سقط مکرر (78) مطرح هستند. البته این مطالعات کوچک بوده و نیاز به تأیید در مطالعات بزرگ‌تر دارند.

KIR2DL4 به ویژه برای نقش در برهمکنش‌های مادر و جنین مورد توجه واقع شده است زیرا به HLA-G، که بر روی تروفوبلاست‌ها بیان می‌شود، متصل می‌گردد. Yan و همکاران نشان داده‌اند که بیان سطح سلولی KIR2DL4 در کنترل‌های سالم در مقایسه با افراد مبتلا به سقط مکرر خود به خودی به طور قابل توجهی بالاتر بوده است (79). علی‌رغم این مطالعات، ضرورت مطلق KIR2DL4 بر روی سلول‌های uNK رد شده است، زیرا زنان فاقد ژن KIR2DL4 روی هم رفته حاملگی‌های موفق با کودکان به ظاهر سالم داشته‌اند (80، 81).

بحث و نتیجه گیری

انواع ژنوتیپ‌های ترکیبی KIR-HLA در پاتوژنز بیماری‌ها و مقاومت در مقابل عفونت‌های ویروسی، بیماری‌های خودایمنی، اختلالات التهابی و سرطان‌ها دخیل دانسته شده‌اند. به‌طور کلی، ژنوتیپ‌های فعال‌کنندگی به نظر می‌رسد که در عفونت‌های ویروسی از قبیل ویروس نقص ایمنی انسان و ویروس هپاتیت C مفید باشند، در حالی که این ژنوتیپ‌ها خطر ابتلا به خود ایمنی و شاید سرطان‌هایی که یک مؤلفه التهابی در پاتوژنز خود دارند را افزایش می‌دهند. بنابراین، تنوع ژنتیکی KIR و اثرات اختصاصی این تنوع در این طیف وسیع از بیماری‌ها مطرح کننده این مطلب است که آنها توانایی قرار گرفتن به عنوان اهداف مناسب درمانی را دارند. تا کنون، استفاده از KIR به عنوان یک هدف مداخله‌ای از مطالعات پیوند مغز استخوان حاصل شده است که در مروری دیگر به آن خواهیم پرداخت.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از راهنمایی‌های با ارزش جناب آقای دکتر نادر تاجیک دانشیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران تقدیر و تشکر می‌گردد.

[Downloaded from yafteh.lums.ac.ir on 2026-11-02]

References

1. Mousavi T, Shahsavar F, Farnia P, Tajik N, Soofi M. Study of KIR Expression and HLA Ligands in CD56+ Lymphocytes of Drug Resistant Tuberculosis Patients. Iran J Allergy Asthma Immunol.2011;10(3):189-194
2. Wu J, Lanier LL. Natural killer cells and cancer. Adv Cancer Res.2003;90:127-156
3. Singal DP, Li J, Zhang G. Role of NK cell receptors in susceptibility to rheumatoid arthritis. Hum Immunol.2000;61(S2):67
4. Mousavi T, Poormoghim H, Moradi M, Tajik N, Shahsavar F, Soofi M. Phenotypic study of natural killer cell subsets in ankylosing spondylitis patients. Iran J Allergy Asthma Immunol.2009;8(4):193-198
5. Winter CC, Long EO. A single amino acid in the p58 killer cell inhibitory receptor controls the ability of natural killer cells to discriminate between the two groups of HLA-C allotypes. J Immunol.1997;158:4026-4028
6. Thananchai H, Gillespie G, Martin MP, Bashirova A, Yawata N, Yawata M, et al. Cutting edge: allele-specific and peptide-dependent interactions between KIR3DL1 and HLA-A and HLA-B. J Immunol.2007; 178:33-37
7. Dohring C, Scheidegger D, Samaridis J et al. A human killer inhibitory receptor specific for HLA-A1, 2. J Immunol.1996;156:3098-3101
8. Shahsavar F, Tajik N, Entezami K. Killer cell immunoglobulin-like receptors and their ligands. Qom University of Medical Sciences Journal.2010;15:47-62
9. Martin AM, Freitas EM, Witt CS, Christiansen FT. The genomic organization and evolution of the natural killer immunoglobulin-like receptor (KIR) gene cluster. Immunogenetics.2000;51:268-280
10. Selvakumar A, Steffens U, Dupont B. Polymorphism and domain variability of human killer cell inhibitory receptors. Immunol Rev.1997;155:183-196
11. Trowsdale J. Genetic and functional relationships between MHC and NK receptor genes. Immunity.2001;15:363-374
12. Hsu KC, Chida S, Geraghty DE , Dupont B. The killer immunoglobulin-like receptor (KIR) genomic region: gene-order, haplotypes and allelic polymorphism. Immunol Rev.2002;190:40-52
13. Martin AM, Kulski JK, Gaudieri S, Witt CS, Freitas EM, Trowsdale J et al. Comparative genomic analysis, diversity and evolution of two KIR haplotypes A and B. Gene.2004; 335:121-131
14. Uhrberg M. The KIR gene family: life in the fast lane of evolution. Eur J Immunol.2005; 35:10-15
15. Du Z, Gjertson DW, Reed EF, Rajalingam R. Receptor-ligand analyses define minimal killer cell Ig-like receptor (KIR) in humans. Immunogenetics.2007;59:1-15
16. Tajik N, Shahsavar F, Mousavi T, Radjabzadeh MF. Distribution of KIR genes in the Iranian population. Tissue Antigens. 2009;74:22-31
17. Rajalingam R. Killer Cell Immunoglobulin-Like Receptors Influence the Innate and Adaptive Immune Responses. Iran J Immunol.2007;4:61-78
18. Tajik N, Shahsavar F, Nasiri MR, Radjabzadeh MF. Compound KIR-HLA

[Downloaded from yafteh.lums.ac.ir on 2026-11-02]

genotype analyses in the Iranian population by a novel PCR-SSP assay. Int J Immnogenetics.2010;37:159-168

19. Raulet DH, Vance RE, McMahon CW. Regulation of the natural killer cell receptor repertoire. Annu Rev Immunol.2001;19:291-330
20. Valiante NM, Uhrberg M, Shilling HG, Lienert-Weidenbach K, Arnett KL, D'Andrea A et al. Functionally and structurally distinct NK cell receptor repertoires in the peripheral blood of two human donors. Immunity.1997; 7:739-751
21. Yawata M, Yawata N, Draghi M, Little AM, Partheniou F, Parham P. Roles for HLA and KIR polymorphisms in natural killer cell repertoire selection and modulation of effector function. J Exp Med.2006;203:633-645
22. Martin MP, Gao X, Lee JH, Nelson GW, Detels R, Goedert JJ et al. Epistatic interaction between KIR3DS1 and HLA-B delays the progression to AIDS. Nat Genet.2002;31(4): 429-434
23. Khakoo SI, Thio CL, Martin MP, Brooks CR, Gao X, Astemborski J et al. HLA and NK cell inhibitory receptor genes in resolving hepatitis C virus infection. Science.2004;305:872-874
24. Van der Slik AR, Koeleman BP, Verduijn W, Bruining GJ, Roep BO, Giphart MJ. KIR in type 1 diabetes: disparate distribution of activating and inhibitory natural killer cell receptors in patients versus HLA-matched control subjects. Diabetes.2003;52:2639-2642
25. Nelson GW, Martin MP, Gladman D, Wade J, Trowsdale J, Carrington M. Cutting edge: heterozygote advantage in autoimmune disease: hierarchy of protection/susceptibility conferred by HLA and killer Ig-like receptor combinations in psoriatic arthritis. J Immunol. 2004;173:4273-4276
26. Nikitina-Zake L, Rajalingam R, Rumba I, Sanjeevi CB. Killer Cell Immunoglobulin-like Receptor Genes in Latvian Patients with Type 1 Diabetes Mellitus and Healthy Controls. Ann N Y Acad Sci.2004;1037:161-169
27. Yen JH, Moore BE, Nakajima T, Scholl D, Schaid DJ, Weyand CM et al. Major histocompatibility complex class I-recognizing receptors are disease risk genes in rheumatoid arthritis. J Exp Med.2001;193: 1159-1167
28. Carrington M, Wang S, Martin MP, Gao X, Schiffman M, Cheng J, et al. Hierarchy of resistance to cervical neoplasia mediated by combinations of killer immunoglobulin-like receptor and human leukocyte antigen loci. J Exp Med.2005;201:1069-1075
29. Naumova E, Mihaylova A, Stoitchkov K, Ivanova M, Quin L, Toneva M. Genetic polymorphism of NK receptors and their ligands in melanoma patients: prevalence of inhibitory over activating signals. Cancer Immunol Immunother.2005;54:172-178
30. Lanier LL. NK cell recognition. Annu Rev Immunol.2005;23:225-274
31. Kulkarni S, Martin MP, Carrington M. The Yin and Yang of HLA and KIR in human disease. Seminars in Immunol.2008;20:343-352
32. Cella M, Longo A, Ferrara GB, Strominger JL, Colonna M. NK3-specific natural killer cells are selectively inhibited by Bw4-positive

[Downloaded from yafteh.lums.ac.ir on 2026-11-02]

HLA alleles with isoleucine 80. J Exp Med. 1994;180(4):1235-1242
33. Gumperz JE, Litwin V, Phillips JH, Lanier LL, Parham P. The Bw4 public epitope of HLA-B molecules confers reactivity with natural killer cell clones that express NKB1, a putative HLA receptor. J Exp Med.1995; 181(3):1133-1144
34. Gumperz JE, Barber LD, Valiante NM, Percival L, Phillips JH, Lanier LL, et al. Conserved and variable residues within the Bw4 motif of HLA-B make separable contributions to recognition by the NKB1 killer cell-inhibitory receptor. J Immunol. 1997;158(11):5237-5241
35. Qi Y, Martin MP, Gao X, Jacobson L, Goedert JJ, Buchbinder S, et al. KIR/HLA pleiotropism: protection against both HIV and opportunistic infections. PLoS Pathog.2006; 2(8):e79
36. Winter CC, Gumperz JE, Parham P, Long EO, Wagtmann N. Direct binding and functional transfer of NK cell inhibitory receptors reveal novel patterns of HLA-C allotype recognition. J Immunol.1998;161: 571-577
37. Ahlenstiel G, Martin MP, Gao X, Carrington M, Rehermann B. Distinct KIR/HLA compound genotypes affect the kinetics of human antiviral natural killer cell responses. J Clin Invest.2008;118(3):1017-1026
38. Romero V, Azocar J, Zuniga J, Clavijo OP, Terreros D, Gu X, et al. Interaction of NK inhibitory receptor genes with HLA-C and MHC class II alleles in Hepatitis C virus infection outcome. Mol Immunol.2008;45(9): 2429-2436
39. Biron CA, Byron KS, Sullivan JL. Severe herpesvirus infections in an adolescent without natural killer cells. N Engl J Med. 1989;320(26):1731-1735
40. Lin A, Xu H, YanW. Mulatioodn of HLA expression in human cytomegalovirus immune evasion. Cell Mol Immunol.2007; 4(2):91-98
41. Gazit R, Garty BZ, Monselise Y, Hoffer V, Finkelstein Y, Markel G et al. Expression of KIR2DL1 on the entire NK cell population: a possible novel immunodeficiency syndrome. Blood.2004;103(5):1965-1966
42. Cook M, Briggs D, Craddock C, Mahendra P, Milligan D, Fegan C, et al. Donor KIR genotype has a major influence on the rate of cytomegalovirus reactivation following T-cell replete stem cell transplantation. Blood.2006; 107(3):1230-1232
43. Mendez A, Granda H, Meenagh A, Contreras S, Zavaleta R, Mendoza MF, et al. Study of KIR genes in tuberculosis patients. Tissue Antigens.2006;68(5):386-389
44. Artavanis-Tsakonas K, Eleme K, Mc Queen KL, Cheng NW, Parham P, Davis DM, et al. Activation of a subset of human NK cells upon contact with Plasmodium falciparum-infected erythrocytes. J Immunol.2003; 171(10):5396-5405
45. Roetynck S, Baratin M, Johansson S, Lemmers C, Vivier E, Ugolini S. Natural killer cells and malaria. Immunol Rev.2006; 214:251-263
46. Abi-Rached L, Parham P. Natural selection drives recurrent formation of activating killer cell immunoglobulin-like receptor and Ly49

[Downloaded from yafteh.lums.ac.ir on 2026-11-02]

from inhibitory homologues. J Exp Med. 2005;201(8):1319-1332
47. Single RM, Martin MP, Gao X, Meyer D, Yeager M, Kidd JR et al. Global diversity and evidence for coevolution of KIR and HLA. Nat Genet.2007;39(9):1114-1119
48. Hou L, Steiner NK, Chen M, Belle I, Kubit AL, Ng J, et al. Limited allelic diversity of stimulatory two-domain killer cell immunoglobulin-like receptors. Hum Immunol.2008;69(3):174-178
49. Majorczyk E, Pawlik A, Luszczek W, Nowak I, Wisniewski A, Jasek M, et al. Associations of killer cell immunoglobulin-like receptor genes with complications of rheumatoid arthritis. Genes Immunol.2007;8(8):678-683
50. Suzuki Y, Hamamoto Y, Ogasawara Y, Ishikawa K, Yoshikawa Y, Sasazuki T, et al. Genetic polymorphisms of killer cell immunoglobulin-like receptors are associated with susceptibility to psoriasis vulgaris. J Invest Dermatol.2004;122(5):1133-1136
51. Luszczek W, Manczak M, Cislo M, Nockowski P, Wisniewski A, Jasek M, et al. Gene for the activating natural killer cell receptor, KIR2DS1, is associated with susceptibility to psoriasis vulgaris. Hum Immunol.2004;65(7):758-766
52. Holm SJ, Sakuraba K, Mallbris L, Wolk K, Stahle M, Sanchez FO. Distinct HLA-C/KIR genotype profile associates with guttate psoriasis. J Invest Dermatol.2005;125(4):721-730
53. Momot T, Koch S, Hunzelmann N, Krieg T, Ulbricht K, Schmidt RE, et al. Association of killer cell immunoglobulin-like receptors with scleroderma. Arthritis Rheum.2004;50(5): 1561-1565
54. Kitawaki J, Xu B, Ishihara H, Fukui M, Hasegawa G, Nakamura N, et al. Association of killer cell immunoglobulin-like receptor genotypes with susceptibility to endometriosis. Am J Reprod Immunol.2007; 58(6):481-486
55. Boyton RJ, Smith J, Ward R, Jones M, Ozerovitch L, Wilson R, et al. HLA-C and killer cell immunoglobulin-like receptor genes in idiopathic bronchiectasis. Am J Respir Crit Care Med.2006;173(3):327-333.
56. Tajik N, Shahsavar F, Poormoghim H, Radjabzadeh MF, Mousavi T, Jalali A. KIR3DL1+HLA-B Bw4Ile80 and KIR2DS1+HLAC2 combinations are both associated with ankylosing spondylitis in the Iranian population. Int J Immnogenetics.2011;38(5):403-409
57. Middleton D, Halfpenny I, Meenagh A, Williams F, Sivula J, Tuomilehto-Wolf E. Investigation of KIR gene frequencies in type 1 diabetes mellitus. Hum Immunol.2006; 67(12):986-990
58. Naumova E, Mihaylova A, Ivanova M, Mihailova S. Impact of KIR/HLA ligand combinations on immune responses in malignant melanoma. Cancer Immunol Immunother.2007;56(1):95-100
59. Katz G, Gazit R, Arnon TI, Gonen-Gross T, Tarcic G, Markel G, et al. MHC class I independent recognition of NK-activating receptor KIR2DS4. J Immunol.2004; 173(3): 1819-1825
60. Gati A, Da Rocha S, Guerra N, Escudier B, Moretta A, Chouaib S, et al. Analysis of the

[Downloaded from yafteh.lums.ac.ir on 2026-11-02]

natural killer mediated immune response in metastatic renal cell carcinoma patients. Int J Cancer.2004;109(3):393-401

61. Butsch Kovacic M, Martin M, Gao X, Fuksenko T, Chen CJ, Cheng YJ, et al. Variation of the killer cell immunoglobulin-like receptors and HLA-C genes in nasopharyngeal carcinoma. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.2005;14(11Pt 1):2673-2677
62. Lopez-Vazquez A, Rodrigo L, Martinez-Borra J, Perez R, Rodriguez M, Fdez- Morera JL et al. Protective effect of the HLA-Bw4I80 epitope and the killer cell immunoglobulin-like receptor 3DS1 gene against the development of hepatocellular carcinoma in patients with hepatitis C virus infection. J Infect Dis.2005;192(1):162-165
63. Verheyden S, Bernier M, Demanet C. Identification of natural killer cell receptor phenotypes associated with leukaemia. Leukemia.2004;18(12):2002-2007
64. Scquizzato E, Teramo A, Miorin M, Facco M, Piazza F, Noventa F, et al. Genotypic evaluation of killer immunoglobulin-like receptors in NK-type lymphoproliferative disease of granular lymphocytes. Leukemia. 2007;21(5):1060-1069
65. Besson C, Roetynck S, Williams F, Orsi L, Amiel C, Lependeven C, et al. Association of killer cell immunoglobulin-like receptor genes with Hodgkin's lymphoma in a familial study. PLoS One.2007;2(5):e406
66. Shahsavar F, Tajik N, Entezami K, Radjabzadeh MF, Asadifar B, Alimoghaddam K, et al. KIR2DS3 is associated with protection against acute myeloid leukemia. Iran J Immunol.2010 ;7(1):8-17
67. Bahler DW, Hartung L, Hill S, Bowen GM, Vonderheid EC. CD158k/KIR3DL2 is a useful marker for identifying neoplastic T-cells in Sezary syndrome by flow cytometry. Cytometry B Clin Cytom.2007;74B(3):156-162
68. MoriceWG, Kurtin PJ, Leibson PJ, Tefferi A, Hanson CA. Demonstration of aberrant T-cell and natural killer-cell antigen expression in all cases of granular lymphocytic leukaemia. Br J Haematol.2003;120(6):1026-1036
69. Nowakowski GS, Morice WG, Phyliky RL, Li CY, Tefferi A. Human leucocyte antigen class I and killer immunoglobulin-like receptor expression patterns in T-cell large granular lymphocyte leukaemia. Br J Haematol.2005;128(4):490-492
70. Zambello R, Falco M, Della Chiesa M, Trentin L, Carollo D, Castriconi R, et al. Expression and function of KIR and natural cytotoxicity receptors in NK-type lymphoproliferative diseases of granular lymphocytes. Blood.2003;102(5):1797-1805
71. Moffett A, Hiby SE. How does the maternal immune system contribute to the development of pre-eclampsia? Placenta.2007;28(Suppl A):S51-S56
72. Hanna J, Goldman-Wohl D, Hamani Y, Avraham I, Greenfield C, Natanson-Yaron S et al. Decidual NK cells regulate key developmental processes at the human fetal-maternal interface. Nat Med.2006; 12(9):1065-1074

[Downloaded from yafteh.lums.ac.ir on 2026-11-02]

73. Trundley A, Moffett A. Human uterine leukocytes and pregnancy. Tissue Antigens. 2004;63(1):1-12
74. Hiby SE, Walker JJ, O'Shaughnessy KM, Redman CW, Carrington M, Trowsdale J, et al. Combinations of maternal KIR and fetal HLA-C genes influence the risk of preeclampsia and reproductive success. J Exp Med.2004;200(8):957-965
75. Paparistidis N, Papadopoulou C, ChiotiA, Papaioannou D, Tsekoura C, Keramitsoglou T, et al. How valuable is measurement of peripheral blood natural killer cells at the time of abortion? Am J Reprod Immunol.2008; 59(4):306-315
76. Varla-Leftherioti M, Spyropoulou-Vlachou M, Keramitsoglou T, Papadimitropoulos M, Tsekoura C, Graphou O, et al. Lack of the appropriate natural killer cell inhibitory receptors in women with spontaneous abortion. Hum Immunol.2005;66(1):65-71
77. Hiby SE, Regan L, Lo W, Farrell L, Carrington M, Moffett A. Association of maternal killer-cell immunoglobulin-like receptors and parental HLA-C genotypes with recurrent miscarriage. Hum Reprod.2008; 23(4):972-976
78. Wang S, Zhao YR, Jiao YL, Wang LC, Li JF, Cui B, et al. Increased activating killer immunoglobulin-like receptor genes and decreased specific HLA-C alleles in couples with recurrent spontaneous abortion. Biochem Biophys Res Commun.2007;360(3):696-701
79. Yan WH, Lin A, Chen BG, Zhou MY, Dai MZ, Chen XJ, et al. Possible roles of KIR2DL4 expression on uNK cells in human pregnancy. Am J Reprod Immunol.2007; 57(4):233-242
80. Witt CS, Whiteway JM, Warren HS, Barden A, Rogers M, Martin A, et al. Alleles of the KIR2DL4 receptor and their lack of association with preeclampsia. Eur J Immunol.2002;32(1):18-29
81. Witt CS, Goodridge J, Gerbase-Delima MG, Daher S, Christiansen FT. Maternal KIR repertoire is not associated with recurrent spontaneous abortion. Hum Reprod.2004; 19(11):2653-2657

[Downloaded from yafteh.lums.ac.ir on 2026-11-02]